

Как проходит вакцинация

В поликлинику на прививку от коронавируса нужно прийти ко времени записи с паспортом, полисом.

Дальше нужно подписать согласие на вакцинацию, отметить в нем отсутствие инфекций и обострения хронических заболеваний, пройти осмотр у врача и подождать, пока наберется пять желающих сделать прививку.

Вакцина «Спутник V» поставляется в замороженном виде по 3 мл — это пять доз, поэтому ее размораживают на месте и сразу вводят пятерым пациентам. Укол сделают в плечо, как при прививке от гриппа.

После прививки нужно провести в поликлинике еще полчаса — это стандартное требование для любой вакцинации. Если у человека появится аллергическая реакция, ему быстро окажут помощь.

У прививки от коронавируса есть побочные эффекты. Так, 10% вакцинированных жалуются на слабость или тошноту, 5,7% — на ломоту в мышцах, озноб, головную боль, температуру выше 37 °С. У 4,7% вакцинированных отмечают боль, зуд, отек и покраснение в месте укола. В течение 1—2 дней все побочные эффекты обычно проходят.

Иммунитет



начинает формироваться
после введения I компонента
вакцины

полностью формируется
только через 2 - 3 недели
после введения II компонента

Двукратная вакцинация




x2 обеспечивает комплексный
иммунный ответ организма.
Даже после вакцинации
пользуйтесь индивидуальными
средствами защиты (маска
и перчатки) и соблюдайте
социальную дистанцию



МОСКВА
125165


Памятка участника

ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ
COVID-19



Узнайте больше
о вакцинации:

www.mos.ru/privivka/



Поздравляем, Вы вакцинированы против COVID-19!

Вы получили вакцину Гам-КОВИД-Вак-2020. В большинстве случаев прививка хорошо переносится. Но и при недомогании волноваться не стоит. Это нормальная индивидуальная реакция организма на вакцину и один из признаков формирования иммунитета.

Возможные индивидуальные реакции, которые проходят в течение 1-3 дней



слабость
недомогание
общая усталость



тошнота

Рекомендуется: уменьшить физическую нагрузку и дать себе отдохнуть



озноб



чувство жара



ломота в теле
и мышцах



головная
боль



повышение температуры
тела выше 37°C

Рекомендуется:

при температуре тела выше 38°C принять жаропонижающие и обезболивающие препараты (парацетамол или ибупрофен).

Если температура тела выше 39°C и не снижается в течение 4-х часов после приема медикаментов, необходимо вызвать врача.



боль, зуд, отек
и покраснение в месте
введения вакцины

Рекомендуется:

как правило, лечения не требуется. Для уменьшения отека и дискомфорта можно принять антигистаминные препараты.



насморк
заложенность
носа



боль
и першение
в горле

Рекомендуется:

положить горло, орошать антисептическими средствами, обильное теплое питье, использование назальных спреев.



повышение
давления



учащение
пульса

